

ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขา

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุพัทธา สารพล, นางสาวพรรณวดี ศรีเสมอและนางสมฤดี บุญเหลือ หน่วยงาน ศัลยกรรมกระดูกชาย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

บทนำและวัตถุประสงค์ : การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ระหว่างวันที่ ๑ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน๒๕๕๕ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความปวดและปัจจัยที่มีผลต่อระดับความปวดของผู้ป่วย

วิธีการศึกษา : ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยอายุ ๑๕ปีขึ้นไปที่ได้รับการผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขาในตีกัลยกรรมหญิง ตีกัลยกรรมกระดูกชาย ตีกพิเศษ๖๐เตียง ตีกพิเศษประกันสังคม ตีกสงฆ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕โดยศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด จำนวน ๑๔๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและการผ่าตัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ได้แก่ Chi square และ Fisher Exact test

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๑.๑ ,อายุ ๖๕ปีขึ้นไป ร้อยละ ๓๔,การศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงมา ร้อยละ ๗๕.๙, ทำเกษตรกรรมร้อยละ ๔๔, สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ ๕๖.๗,ไม่มีโรคประจำตัวร้อยละ๙๓.๖ ,ไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนร้อยละ ๙๐.๘, ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด๖๐-๙๐นาทีร้อยละ ๔๑.๘, ตำแหน่งของกระดูกที่หักเป็นส่วนของกระดูก proximal of femur ร้อยละ ๔๘.๙ ,มีความปวดอยู่ในระดับปานกลาง (๔-๖ คะแนน) ร้อยละ ๔๕.๔ และได้รับการจัดการความปวด ร้อยละ ๗๗, ภายในเวลา ๑-๕ นาทีร้อยละ ๕๖.๗ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ การจัดการความปวด และระยะเวลาในการจัดการความปวดโดยใช่ยา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความปวดหลังผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขามีระดับความปวดอยู่ในระดับปานกลางและตัวแปรเพศ อายุ การจัดการความปวด และระยะเวลาในการจัดการความปวดมีผลต่อระดับความปวดของผู้ป่วยดังนั้นพยาบาลควรมีการประเมินความปวดหลังผ่าตัดและทำการบันทึกทางการพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดในเวชระเบียน อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานทางการพยาบาล ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล และเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง