

R-๒๕. ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาเทคนิคการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้ผิวหนังต่ออัตราการเกิดรอย
จ้ำเลือดหรือก้อนเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันโรงพยาบาลศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน/ผู้นำเสนอ : นางจิรภา ตาแสง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรอนงค์ จันทร์จรัสจิตต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วัตถุประสงค์ : มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเกิดรอยจ้ำเลือดหรือก้อนเลือด และเปรียบเทียบ
อัตราการเกิดรอยจ้ำเลือดหรือก้อนเลือด จากการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้ผิวหนัง ระหว่างก่อน
และหลังพัฒนาเทคนิคการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้ผิวหนัง

วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ /อุดตัน ที่เข้ารับการใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ๓๐ ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป,
แบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและแบบบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรักษา เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่
Chi- square

ผลการศึกษา : พบการเกิดจ้ำเลือดหรือก้อนเลือดภายหลังฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้
ผิวหนัง ในกลุ่มก่อนดำเนินการจำนวน ๙ ราย (๖๐ %) และกลุ่มหลังดำเนินการจำนวน ๖ ราย (๔๐%) ($p =$
.๑๓๒) ผลการพัฒนาเทคนิคการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้ผิวหนัง ทำให้การเกิดจ้ำเลือดหรือก้อน
เลือดหลังการพัฒนาเทคนิคการฉีดยาลดลงแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

สรุปและข้อเสนอแนะ : ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยจ้ำเลือดหรือ
ก้อนเลือด เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและมีการพัฒนา
รูปแบบการบริหารยา Enoxaparin เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการบริหารยา Enoxaparin ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งโรงพยาบาล